

Colonoscopia con Miralax / Prep Gatorade

Intestine

Por favor, no tomar productos que contienen aspirina durante 5 días antes del examen. Estos son: aspirina, Ibuprofen, Advil, Motrin Aleve, Naprosyn y medicamentos para la artritis. Usted también necesita mantener los suplementos de hierro durante 5 días. Si está tomando anticoagulantes como Coumadin, Plavix, Aggrenox, Lovenox, etc, por favor mantenga estos medicamentos durante 5 días antes del examen también. Usted puede tomar la prednisona. Si usted necesita tomar medicamento para dolores y malestares generales, Puede tomar Tylenol solamente.

Requisitos que tiene que comprar en la farmacia:

- Botella 238 g de Miralax laxantes (estes Medicamiento no requiere receta)
- Caja de pastillas laxantes Dulcolax (Bisacody) no compre el suavizante de feces!
- 64 oz de Gatorade Cualquier sabor, excepto aquellos que son de color rojo o color morada oscuro.

Día antes de el procedimiento

- Usted debe estar en una dieta de líquidos claros el día antes de su procedimiento. Esto incluye: agua, gelatina, caldo, jugo, refrescos, café, te, y bebidas deportivas. Evite los líquidos que son de color rojo oscuro o morado en color. Ninguna leche o productos lácteos. También evite los jugos con pulpa. Es muy importante que usted beba muchos líquidos durante todo el día!
- A primera hora de la mañana mezcle la botella entera del Miralax en 64 onzas. De Gatorade.
- A las 3:00 pm, tome 4 tablets de laxantes Dulcolax. Tome todas juntas, sin triturar o masticar.
- A las 5:00 p.m de la tarde, empiece a beber el Gatorade mezclado en Miralax. Beba un caso de 8 onzas cada 10-15 minutos hasta que la solución ha desaparecido por completo.
- Usted puede tomar líquidos claros hasta la medianoche, entonces nada de beber después de medianoche.
- No dude en llamar a la oficina con cualquier pregunta o dudas. 620-225-1650.

- Alguien debe estar con usted para llevarlo a su casa.